

# スプレキュア<sup>®</sup>点鼻液 0.15% をお使いになる方へ

このお薬は、医師の指示した用法・用量に従い、下記の「ご使用に際しての注意」をよくお読みの上、正しくご使用ください。

このお薬は、生殖補助医療における卵胞成熟を促すことを目的として使用される他、子宮内膜症を治療、及び子宮筋腫、中枢性思春期早発症に伴う諸症状を改善します。医師の指示に従って必ず継続して使用してください。継続して使用しないとお薬の効果が期待できなくなります。



## ご使用（噴霧操作）に際しての注意

使用の都度、台座のネジがしっかりと閉まっているかどうかを確認してください。

徐々に噴霧器の台座のネジがゆるんでくることがあります。使用の都度、必ず噴霧器が薬液瓶にしっかりと固定されていることをご確認ください。



点鼻後は噴霧器をティッシュ等で拭きとり、清潔に保つようにしてください。使用後は、噴霧器が薬液瓶に固定され、しっかりと閉まっていることを確認の上、ケースに入れて保管してください。

携帯時には立ててお持ちください。（横にすると液漏れの原因となります。）

噴霧器が正常に作動しない等、ご使用に際して不都合な点がございましたら、医師または薬剤師にご相談ください。

➡ 噴霧時の注意等は、裏面をご覧ください。なお、詳しくは「スプレキュア点鼻液 0.15% をお使いになる方へ ご使用に際して」の小冊子をご覧ください。

**CLINIGEN**

クリニジェン株式会社

東京都中央区日本橋1-16-3 日本橋木村ビル6階

SUP220410

正



やや下を向き、噴霧器を左右の鼻腔の奥まで垂直にいれ、1回ずつ噴霧。(カチッと音がし可動部が止まるまで一気に噴霧してください。)

誤



噴霧器の入れ方が浅いと薬液が漏れ落ちますので奥までいれて正しく噴霧吸入してください。



噴霧器をいれたとき、上を向くと噴霧されません。



※液吸入パイプの先端が薬液に届かなくなり、噴霧されません。

噴霧時の薬液瓶の角度



2回目以降の噴霧時には、この操作は必要ありません。

噴霧状態



[注] 薬液が出ない場合、無理に可動部を押さないでください。装置が破損するおそれがあります。